



Asociación Colombiana de Infectología-ACIN

NIT: 800.018.763-2

Calle 118 # 15-24 Of. 503 Edificio Gallerie

Bogotá D.C. Colombia

Teléfono: (571) 2153714/ Telefax: (571) 2153517

Página web: www.acin.org E-mail: secretaria@acin.org

Bogotá 24 de mayo de 2020

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE INFECCIÓN POR SARS CoV-2-COVID-19

Deseamos informar a la opinión pública que en la última reunión de expertos del Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud realizada el día 23 de mayo de 2020 se llevó a cabo la revisión detallada de los nuevos datos y estudios clínicos y se actualizaron las siguientes recomendaciones basadas en consenso de expertos e informadas en la evidencia:

¿Cuáles son los medicamentos utilizados para infección SARS-CoV-2/COVID-19?

- Se sugiere no usar en la práctica clínica Hidroxicloroquina o Cloroquina en el manejo de pacientes con infección por SARS-CoV-2/COVID-19.
Débil en contra
Punto de buena práctica
El uso de Hidroxicloroquina o Cloroquina solo se considerará en el escenario de un experimento clínico aprobado
- No se emite recomendación a favor o en contra para el uso de Lopinavir/Ritonavir en pacientes con infección por SARS-CoV-2/COVID-19.
Punto de buena práctica
El uso de Lopinavir/ritonavir solo se considerará en el escenario de un experimento clínico aprobado
- No hay consenso para emitir una recomendación ni a favor ni en contra para el uso de Tocilizumab en pacientes con infección por SARS-CoV-2/COVID-19.
- Se recomienda no usar Azitromicina como antiviral sola o en combinación en pacientes con infección por SARS-CoV-2/COVID-19.
Fuerte en contra
- Se sugiere que la terapia con interferón B como antiviral en infección por SARS-CoV-2/COVID-19 se considere solo en escenarios de experimentos clínicos aprobados.
Débil a favor



Asociación Colombiana de Infectología-ACIN

NIT: 800.018.763-2

Calle 118 # 15-24 Of. 503 Edificio Gallerie

Bogotá D.C. Colombia

Teléfono: (571) 2153714/ Telefax: (571) 2153517

Página web: www.acin.org E-mail: secretaria@acin.org

- Se sugiere que el uso de Remdesivir como antiviral en infección por SARS-CoV-2/COVID-19 se considere solo en escenarios de experimentos clínicos aprobados.
Débil a favor
- Se sugiere que el uso de Ivermectina como antiviral en infección por SARS-CoV-2/COVID-19 se considere solo en escenarios de experimentos clínicos aprobados.
Débil a favor
- No se emite recomendación a favor o en contra para el uso de corticoesteroides en casos de infección por SARS-CoV-2/COVID-19.

Punto de buena práctica

Considerar el uso de corticoides con otras indicaciones diferentes a COVID-19 en las cuales se considere eficaz (exacerbación de EPOC, crisis asmática, shock séptico con uso de dosis altas de vasopresores, insuficiencia adrenal)

- Se recomienda no usar inhibidores de neuroaminidasa (oseltamivir) en infección por SARS CoV2 ya que no tiene actividad frente a SARS-CoV-2/COVID-19.
Fuerte en contra

Punto de buena práctica clínica

Si se sospecha infección por Influenza, o se tiene evidencia de la misma está indicado el uso de oseltamivir.

Estas recomendaciones estarán incluidas en la próxima actualización del Consenso.

Cordialmente,

Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud.