

2026

VACUNACIÓN PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Calendario vacunal en población con comorbilidades

Se sugiere revisar las tablas adicionales para las indicaciones de vacunación según las comorbilidades y el riesgo individual, y el anexo técnico para las consideraciones específicas de vacunación frente a cada enfermedad.



VACUNA	Enfermedad renal en etapa terminal o en diálisis	Enfermedad cardíaca	Enfermedad pulmonar	Enfermedad hepática crónica o alcoholismo	Diabetes
Dengue	Vacunar con 2 dosis (0-3 meses) a viajeros y residentes de zonas endémicas, con o sin seropositividad previa				
Fiebre amarilla	Vacunar con 1 dosis única si hay riesgo, o situación epidemiológica/viaje. Refuerzos según excepciones de circular de MinSalud				
Hepatitis A	Vacunar con 2 dosis si está en hemodiálisis (0 - 6 meses) y si no hay evidencia de inmunidad. (ver anexo técnico)	Vacunar según riesgo: 1 - 2 dosis (0 - 6 meses) (ver anexo técnico)		Vacunar con 2 dosis (0 - 6 meses) (ver anexo técnico)	Vacunar según riesgo: 2 dosis (0 - 6 meses) (ver anexo técnico)
Hepatitis B	Vacunar con 3 dosis de vacuna de antígeno único (0 - 1 - 6 meses), si no hay evidencia de inmunidad. Ajustes de dosis en algunas condiciones. Realizar monitoreo de Anti-Hbs anual (ver anexo técnico)	Vacunar con 3 dosis de vacuna de antígeno único (0 - 1 - 6 meses), si no hay evidencia de inmunidad (ver anexo técnico)	Vacunar con 3 dosis (0 - 1 - 6), según riesgo si no hay evidencia de inmunidad (ver anexo técnico)	Vacunar con 3 dosis de vacuna de antígeno único (0 - 1 - 6 meses), si no hay evidencia de inmunidad (ver anexo técnico)	Vacunar con 3 dosis de vacuna de antígeno único (0 - 1 - 6 meses), si no hay evidencia de inmunidad (ver anexo técnico)
Influenza	Vacunar con 1 dosis anual; en algunos casos cubierta por el sistema de salud, según lineamientos nacionales de vacunación contra influenza (ver anexo técnico)				
Meningococo ACWY	Vacunar si hay factores de riesgo adicionales con 2 dosis (0 - 2 mes); recomendaciones de refuerzo específicas para algunas comorbilidades (ver anexo técnico)				
Meningococo B	Vacunar si hay factores de riesgo adicionales con 2 dosis (0 - 1 mes); recomendaciones de refuerzo específicas para algunas comorbilidades (ver anexo técnico)				
Mpox	Vacunar según riesgo, la dosis cambia de acuerdo con el tipo de vacuna disponible (ver anexo técnico). Disponible en Colombia para brotes				
Neumococo (PCV13, PCV15, PCV20, PCV21, PPSV23)	Se sugiere para Colombia vacunación secuencial 1 dosis de PCV13 o PCV15 seguida de PPSV23, con refuerzo de PPSV23 cinco años después. Cuando PCV20 o PCV21 estén disponibles sólo se requerirá 1 dosis única sin administrar PPSV23 (ver anexo técnico)				
Sarampión, paperas, rubéola	Vacunar con 1 o 2 dosis de SRP o SR en la edad adulta, según vacunación previa y riesgo (ver anexo técnico)				
SARS-CoV-2	Todos los adultos con estas comorbilidades deberían tener en su historial de vacunación un esquema primario de 2 dosis + mínimo 1 refuerzo (ver anexo técnico). Para esta población se recomienda refuerzo anual con vacunas actualizadas (ver anexo técnico)				
Tétanos, difteria, tos ferina (Tdap o Td)	Vacunar con 1 dosis de Tdap, luego Td o refuerzo de Tdap cada 10 años				
	Según riesgo y vacunas previas: 1 dosis de Tdap cada embarazo; 1 dosis de Td/Tdap en presencia de heridas por trauma, o 1 dosis de Tdap para 'Estrategia Capullo'				
Varicela	Vacunar con 2 dosis (0-1 mes) si no hay evidencia de inmunidad o esquema incompleto en menores de 50 años, sin inmunosupresión (ver anexo técnico)				
Virus sincitial respiratorio	Vacunar con 1 dosis en mayores de 60 años con enfermedad renal terminal o diálisis	Vacunar con 1 dosis en mayores de 60 años con enfermedad cardíaca	Vacunar con 1 dosis en mayores de 60 años con enfermedad pulmonar	Vacunar con 1 dosis en mayores de 60 años con enfermedad hepática	Vacunar con 1 dosis en mayores de 60 años con diabetes
Zóster recombinante	Vacunar con 2 dosis (0 - 1 meses) en presencia de comorbilidad por riesgo aumentado de herpes zoster				
Vacuna recomendada para adultos que no tengan evidencia de inmunidad para esta enfermedad	Vacunación recomendada para adultos que no tengan evidencia de inmunidad y tengan un factor de riesgo adicional u otra indicación.	Vacunación recomendada cuando esté disponible en el país, para adultos que cumplen con los requisitos de edad y carecen de documentación de vacunación o de evidencia de inmunidad	Vacunación recomendada cuando esté disponible en el país, para adultos con un factor de riesgo adicional u otra indicación	Vacuna contraindicada en esta población	Sin recomendación/ no aplicable