

VACUNA	Rango de edad				
	18 - 26 años	27 - 49 años	50 - 59 años	≥ 60 años	
Dengue	Vacunar con 2 dosis (0-3 meses) a viajeros y residentes de zonas endémicas, con o sin seropositividad previa			Uso no aprobado. En algunos países hay aprobación en personas con riesgo alto de dengue grave o escenarios de brote, bajo decisión individual concertada.	
Fiebre amarilla	Vacunar según riesgo con 1 dosis única en la vida; refuerzos según excepciones de circular de MinSalud.			Se sugiere individualizar la vacunación para fiebre amarilla en pacientes mayores de 60 años, según el riesgo epidemiológico definido por MinSalud	
Hepatitis A	Vacunar según riesgo o por solicitud del paciente: 1-2 dosis (0-6 meses)				
Hepatitis B	Vacunar con 3 dosis de vacuna de antígeno único (0 - 1 - 6 meses). Ajustes de dosis en algunas comorbilidades (ver anexo técnico)			Vacunar con 3 dosis (0 – 1 - 6) según riesgo (ver anexo técnico)	
Influenza	Vacunar con 1 dosis anual, en algunos casos cubierta por el sistema de salud según lineamientos nacionales de vacunación contra influenza (ver anexo técnico)				
Meningococo ACWY	Vacunar según riesgo con 2 dosis (0 - 2 meses). Recomendaciones de refuerzo específicas para algunas comorbilidades (ver anexo técnico)				
Meningococo B	Vacunar según riesgo con 2 dosis (0 - 1 mes). Recomendaciones de refuerzo específicas para algunas comorbilidades (ver anexo técnico)				
Mpox	Vacunar según riesgo, la dosis cambia de acuerdo con el tipo de vacuna disponible (ver anexo técnico). Disponible en Colombia para brotes				
Neumococo (PCV13, PCV15, PCV20, PCV21, PPSV23)	Vacunar según riesgo. Se sugiere para Colombia vacunación secuencial 1 dosis de PCV13 o PCV15, seguida de PPSV23, con refuerzo de PPSV23 cinco años después. Cuando PCV20 o PCV21 estén disponibles sólo se requerirá 1 dosis única sin PPSV23 (ver anexo técnico)		Vacunación secuencial 1 dosis de PCV13 o PCV15, seguida de PPSV23, con refuerzo de PPSV23 cinco años después. Cuando PCV20 o PCV21 estén disponibles, solo se requerirá 1 dosis única sin PPSV23 (ver anexo técnico)		
Sarampión, paperas, rubéola, SRP	Vacunar con 1 o 2 dosis de SR o SRP en la edad adulta, según vacunación previa y riesgo (ver anexo técnico)			No recomendada después de los 65 años	
SARS-CoV-2	Todos los adultos deberían tener en su historial de vacunación un esquema primario (2 o 3 dosis según estado inmune) + 1 refuerzo (ver anexo técnico)			Vacunar a todos. Deben recibir esquema primario + 1 refuerzo anual con vacunas actualizadas.	
Tétanos, difteria, tos ferina (Tdap o Td)	Vacunar con 1 dosis de Tdap, luego Td o refuerzo de Tdap cada 10 años				
	Según riesgo y vacunas previas: 1 dosis de Tdap cada embarazo; 1 dosis de Td/Tdap en presencia de heridas por trauma, o 1 dosis de Tdap para 'Estrategia Capullo'				
Varicela	Vacunar con 2 dosis (0 - 1 mes) si nació en 1980 o después, y no hay evidencia de inmunidad (ver anexo técnico)		Si nació antes de 1980, no requiere vacunación porque se considera inmunizado contra varicela.		
Virus del papiloma humano	Si previamente no recibió vacunación, aplicar 2 dosis. Si está inmunocomprometido, 3 dosis	Vacunar con serie de 3 dosis a personas entre 27 y 45 años, según decisión concertada con el paciente, de acuerdo al riesgo (ver anexo técnico)		No aprobada	
Virus sincitial respiratorio	Vacunar en cada embarazo con 1 dosis después de la semana 28 de embarazo		No hay recomendación		1 dosis ≥ 60 años con factores de riesgo de enfermedad grave (ver anexo técnico)..
Zóster recombinante	Vacunar con 2 dosis (0 - 1 meses) para pacientes con riesgo (ver anexo técnico)		Vacunar con 2 dosis en mayores de 50 años (0 - 2 a 6 meses)		
<div><div>Vacuna recomendada para adultos en este rango de edad</div><div>Vacunación recomendada para adultos con un factor de riesgo adicional u otra indicación</div><div>Vacunación recomendada cuando esté disponible en el país, para adultos que cumplen con los requisitos de edad y carecen de documentación de vacunación o de evidencia de inmunidad</div><div>Vacunación recomendada cuando esté disponible en el país, para adultos con un factor de riesgo adicional u otra indicación</div><div>Vacuna contraindicada en el rango de edad</div><div>Sin recomendación/ no aplicable</div></div>					